

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 12016061

Назва сорту: Доджер

Заявник (код): 1991

Власник сорту (код): 1991

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.10.2016

Патент № 160885

Дата пріоритету: 07.12.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160230

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тілки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	8	21,2	15,4
± до усередненої урожайності, ц/га	-6,6	1,6	-4,5
± до усередненої урожайності, %	-45	8	-23
Маса 1000 насінин, г	3,5	3,8	3,4
Висота рослин, см	93	116	114
Стійкість до:			
- вилягання	9	9	9
- осипання	6,7	7,7	8,8
- засухи	7,6	7	7,3
- пильщика ріпакового	9	9	9
- ріпакового квіткоїду	9	8,8	8
- бактеріозу	9	9	9
- пероноспорозу	9	9	9
Вміст, %:			
- білка	26	25,1	24
- олії	43,9	45,6	45,8
- глюкозинолатів	0,8	0,7	0,6
- ерукової кислоти	0,1	0,1	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.