

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis*

Заявка № 15101004 Назва сорту: Телержі **Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840**

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.05.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170801

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною	середній	5
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	наявна	9
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	помірна	5
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	слабка	3
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: діаметр	середній	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно широко-еліптична	2
20	За винятком сортів з трикутною голівкою: Головка: закручування краю	слабке	3
21	Головка: забарвлення	білувате	1
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	біле	1
26	Скоростиглість: за весняного садіння	пізня	7
27	Скоростиглість: за літнього садіння	середній осінній тип	5
28	Чоловіча стерильність	повна	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність – 72 т/га, товарна врожайність – 65 т/га, період від повних сходів до початку досягання – 80 діб, період плодоношення – 15 діб, вміст білка – 2,0%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.