

**Вид:** Морква *Daucus carota* L.

**Заявка №** 14109016 **Назва сорту:** Шантеклер **Заявник (код):** 1833 **Власник сорту (код):** 1833

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.02.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 170552

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: за шириною	середня	5
2	Листок: положення	горизонтальне	5
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	довгий	7
4	Листок: розсіченість	груба	7
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	вужькотрикутна	4
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10: Коренеплід: тенденція до кінчної форми	дуже сильна	9
12	Коренеплід: форма плеча	від плескатої до округлої	2
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	сильно загострений	3
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	мала	3
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	слабка	3
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	слабка	3
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	темніше	3
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	слабка	3
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	ознака не визначається	0
29	Рослина: тенденція до стрілкування	ознака не визначалась	0
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	велика	3
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна урожайність – 70 т/га. Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стиглості – 120 діб. Вміст каротину – 23,4 мг%. Вміст загального цукру – 8,2 %. Вміст сухої речовини – 7,8%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Полісся, Лісостеп, Степ.