

**Вид:** Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

**Заявка № 14110022 Назва сорту:** Браніна **Заявник (код):** 753 **Власник сорту (код):** 753

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** **Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.05.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170887**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	наявна	9
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5
4	Листкова пластинка: положення	поникле	3
5	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	гіноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2 або 3	4
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	малий	3
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2
22	Плід: форма основи	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білоплідних сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: борозенки	наявні	9
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: покрив за щільністю	нещільний	3
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	малий	3
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плями	наявні	9
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/3 довжини	1
40	Плід: щільність плям	дуже нещільна	1
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i> )	високо стійкий	3
46	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	високо стійкий	3
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	ознака не визначалась	0
48	Стійкість проти бурої плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )	відсутня	1
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка ( <i>CVYV</i> )	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка ( <i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)</i> )	наявна	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна урожайність – 45 т/га, вміст сухої речовини у плоді – 2%, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості – 48 діб, період плодоношення – 70 діб.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ.