

Вид: Патисон *Cucurbita pepo* var. *melopepo* (L.) Harz**Заявка № 14149001 Назва сорту:** Сіріус **Заявник (код):** 1918 **Власник сорту (код):** 1918**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 22.05.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170893****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: форма сім'ядолей	округла	4
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	слабка	3
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	пряма	2
4	Рослина: габітус	кущовий	1
5	Рослина: галуження	відсутнє	1
6	Рослина: ступінь галуження	ознака не визначалась	0
7	Лице кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	від прямого до напівпрямого	2
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	дуже слабка	1
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1
11	Стебло: вусики	відсутні абоrudimentarni	1
12	Листкова пластинка: розмір	середній	5
13	Листкова пластинка: розсіченість	мілка	3
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначалась	0
17	Черешок: за довжиною	довгий	7
18	Черешок: кількість шипів	середня	5
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9
20	Жіноча квітка: забарвлення кільца всередині віночка	зелене	2
21	Лице сорти з зеленим забарвленням кільца всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	слабка	3
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільца всередині віночка	зелене	2
24	Лице сорти з зеленим забарвленням кільца всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	помірна	5
25	Лице сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	ознака не визначається	0
26	Лице сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма	ознака не визначається	0
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	біле	1
28	Лице сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0
29	Лице сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	слабка	3
30	Плід: переважаюча форма	дископодібна	1
31,1	Лице сорти типу патисон. Плід: за довжиною	довгий	7
31,2	Лице сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,3	Лице сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,4	Лице сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
32,1	Лице сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	великий	7
32,2	Лице сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,3	Лице сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
33,2	Лице сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,3	Лице сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
34,1	Лице сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0
34,2	Лице сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0
35	Лице сорти типу мініаторний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
36	Лице сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	помірне	5
37	Лице сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	посередині	1
38	Лице сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	пряма	1
39	Лице сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	плaska	1
40	Лице сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
41	Лице сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
42	Лице сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
43	Лице сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
44	Лице сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0
45	Лице сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	ознака не визначається	0
46	Плід: боріздки	наявні	9
47	Плід: боріздки за глибиною	середні	5
48	Плід: ребра	відсутні	1
49	Плід: ступінь виявлення ребер	ознака не визначалась	0
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	біле	1
51	Лице сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
52	Лице сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
53	Лице сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0
54	Плід: смужки на боріздах	відсутні	1
55	Плід: забарвлення смужок на боріздах	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	ознака не визначалась	0
57	Плід: плямистість	відсутня	1
58	Плід: розмір основних плям	ознака не визначалась	0
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	ознака не визначалась	0
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0
62	Плід: бородавки на шкірці	наявні	9
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	мала	3
64	Плід: розмір квіткового рубця	великий	7
65	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	слабка	3
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	біле	1
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначалась	0
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	ознака не визначалась	0
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	відсутній	1
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначалась	0
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	жовте	2
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1
77	Насініна: розмір	середній	5
78	Насініна: форма	епіптична	5
79	Насініна: лушпиння	наявне	9
80	Насініна: наявне лушпиння	повністю розвинене	2
81	Насініна: забарвлення	кремове	2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарний рожай – 15,2 т/га, вміст сухої речовини – 6,2%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.