

Вид: Перець однорічний (гіркий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 13112001 Назва сорту: Бібо **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.05.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170894

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|------|--|----------------------------------|-----|
| 1 | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля | наявне | 9 |
| 2 | Рослина: габітус | напівпрямий | 2 |
| 3 | Рослина: довжина головного стебла | середнє | 5 |
| 4 | Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині) | наявні | 9 |
| 5 | Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки) | більше трьох | 3 |
| 6 | Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку) | ознака не визначається | 0 |
| 7 | Рослина: антоціанове забарвлення вузлів | наявне | 9 |
| 8 | Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів | дуже слабке | 1 |
| 9 | Стебло: опушення вузлів | помірне | 5 |
| 10 | Рослина: за висотою | низька | 3 |
| 11 | Листок: довжина пластинки | середня | 5 |
| 12 | Листок: ширина пластинки | дуже вузька | 1 |
| 13 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірне | 5 |
| 14 | Листок: за формою | овальний | 2 |
| 15 | Листок: хвилястість краю | слабка | 3 |
| 16 | Листок: пухирчастість | слабка | 3 |
| 17 | Листок: форма в поперечному перерізі | помірно увігнута | 3 |
| 18 | Листок: глянуватість | помірна | 5 |
| 19 | Квітконіжка: положення | похиле | 2 |
| 20 | Квітка: антоціанове забарвлення пиляків | наявне | 9 |
| 21 | Плід: забарвлення (перед досяганням) | зелене | 3 |
| 22 | Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням) | помірне | 5 |
| 23 | Плід: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 |
| 24 | Плід: положення у просторі | поникле | 3 |
| 25 | Плід: за довжиною | дуже довгий | 9 |
| 26 | Плід: діаметр | дуже малий | 1 |
| 27 | Плід: відношення довжина/діаметр | дуже велике | 9 |
| 28 | Плід: форма у поздовжньому розрізі | вузько трикутна | 8 |
| 29 | Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти) | кругла | 3 |
| 30 | Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 31 | Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги) | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 32 | Плід: структура поверхні | гладенька або злегка зморшкувата | 1 |
| 33 | Плід: забарвлення (за досягання) | червоне | 3 |
| 34 | Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання) | помірне | 5 |
| 35 | Плід: глянуватість | сильна | 7 |
| 36 | Плід: порожнина у плодоніжці | відсутня | 1 |
| 37 | Плід: глибина порожнини у плодоніжці | ознака не визначається | 0 |
| 38 | Плід: форма верхівки | дуже загострена | 1 |
| 39 | Плід: глибина борозенок між частками | відсутні або дуже мілкі | 1 |
| 40 | Плід: кількість часток | переважно дві | 1 |
| 41 | Плід: товщина м'якоті | дуже тонка | 1 |
| 42 | Плодоніжка: за довжиною | середня | 5 |
| 43 | Плодоніжка: за товщиною | тонка | 3 |
| 44 | Чашечка: за характером виявлення | необгортаюча | 1 |
| 45 | Плід: капсицин у плаценті | наявний | 9 |
| 46 | Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі) | середній | 5 |
| 47 | Час досягання | ранній | 3 |
| 48,1 | Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco Mosaic Virus (0)) | ознака не визначалась | 0 |
| 48,2 | Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2)) | ознака не визначалась | 0 |
| 48,3 | Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)) | ознака не визначалась | 0 |
| 49,1 | Стійкість до Potato Virus: Патотип 0 | ознака не визначалась | 0 |
| 49,2 | Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 | ознака не визначалась | 0 |
| 49,3 | Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2 | ознака не визначалась | 0 |
| 50 | Стійкість до Phytophthora capsici | ознака не визначалась | 0 |
| 51 | Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV) | ознака не визначалась | 0 |
| 52 | Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) | ознака не визначалась | 0 |
| 53 | Стійкість до Xanthomonas campestris pv. vesicatoria | ознака не визначалась | 0 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарний урожай – 200 т/га. Тривалість періоду до досягання – 55 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.