

**Вид:** Перець однорічний (гіркий) *Capsicum annuum* L.**Заявка № 15112002 Назва сорту:** Хомера **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.03.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170557****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9
2	Рослина: габіус	напівпрямий	2
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжузлями. Рослина: кількість міжузлів між першою квіткою та укороченими міжузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжузлів (на пагонах I-го порядку)	довгі	7
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	сильне	7
9	Стебло: опущення вузлів	слабке	3
10	Рослина: за висотою	висока	7
11	Листок: довжина пластинки	середня	5
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвильистість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма в поперечному перерізі	плоска	5
18	Листок: глянсуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	похиле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пилляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досягненням)	жовтувате	2
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досягненням)	світле	3
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	ознака не визначалася	0
25	Плід: за довжиною	дуже довгий	9
26	Плід: діаметр	малий	3
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже велике	9
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	вузько трикутна	8
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	еліптична	1
30	Плід: хвильистість перикарпу у базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвильистість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	помірна	5
32	Плід: структура поверхні	злегка зморшкувана	2
33	Плід: забарвлення (за досягнення)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягнення)	темне	7
35	Плід: глянсуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	заокруглена	3
39	Плід: глибина борозенок між частками	відсутні або дуже мілкі	1
40	Плід: кількість часток	переважно дві	1
41	Плід: товщина мякоті	тонка	3
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	обгортаюча	2
45	Плід: капсічин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3
47	Час досягнення	дуже ранній	1
48,1	Стійкість до <i>Tobamovirus</i> : Патотип 0 ( <i>Tobacco Mosaic Virus (0)</i> )	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Tobamovirus</i> : Патотип 1-2 ( <i>Tomato Mosaic Virus (1-2)</i> )	відсутня	1
48,3	Стійкість до <i>Tobamovirus</i> : Патотип 1-2-3 ( <i>Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)</i> )	відсутня	1
49,1	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 0	відсутня	1
49,2	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1	відсутня	1
49,3	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1 – 2	відсутня	1
50	Стійкість до <i>Phytophthora capsici</i>	відсутня	1
51	Стійкість до <i>Cucumber Mosaic Virus (CMV)</i>	відсутня	1
52	Стійкість до <i>Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)</i>	відсутня	1
53	Стійкість до <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>	відсутня	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Товарна урожайність – 130 т/га. Тривалість періоду до досягнення – 95 діб. Товщина стінки плоду – 4 мм. Середня маса плоду – 100 г. Вміст вітаміну С – 12,1 мг%. Вміст загального цукру – 5,4 %. Вміст клітковини – 2,4 %. Вміст сухої речовини – 8,1 %. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1-9): анtrakноз – 8, гниль верхівкова – 8, вірусні хвороби – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** закритий ґрунт.