

**Вид:** Перець однорічний (гіркий) *Capsicum annuum* L.**Заявка № 15112004 Назва сорту:** Янка **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.05.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170896****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9
2	Рослина: габіус	ознака не визначалась	0
3	Рослина: довжина головного стебла	довге	7
4	Рослина: укорочені міжузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжузлями. Рослина: кількість міжузлів між першою квіткою та укороченими міжузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжузлів (на пагонах I-го порядку)	довгі	7
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірне	5
9	Стебло: опущення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1
10	Рослина: за висотою	висока	7
11	Листок: довжина пластинки	коротка	3
12	Листок: ширина пластинки	вузька	3
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	ланцетний	1
15	Листок: хвильастість краю	ознака не визначалась	0
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма в поперечному перерізі	плоска	5
18	Листок: глянсуватість	слабка	3
19	Квітконіжка: положення	поникле	3
20	Квітка: антоціанове забарвлення пилляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досягненням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досягненням)	свіtle	3
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	довгий	7
26	Плід: діаметр	малий	3
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже велике	9
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	вузько трикутна	8
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	еліптична	1
30	Плід: хвильастість перикарпу у базальній частині	помірна	5
31	Плід: хвильастість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	помірна	5
32	Плід: структура поверхні	злегка зморшкувата	2
33	Плід: забарвлення (за досягнення)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягнення)	свіtle	3
35	Плід: глянсуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	дуже загострена	1
39	Плід: глибина борозенок між частками	мілкі	3
40	Плід: кількість часток	переважно дві	1
41	Плід: товщина мякоті	дуже тонка	1
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	тонка	3
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсічин у плаценті	наявний	9
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ознака не визначалась	0
47	Час досягнення	ранній	3
48,1	Стійкість до <i>Tobamovirus</i> : Патотип 0 ( <i>Tobacco Mosaic Virus (0)</i> )	наявна	9
48,2	Стійкість до <i>Tobamovirus</i> : Патотип 1-2 ( <i>Tomato Mosaic Virus (1-2)</i> )	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до <i>Tobamovirus</i> : Патотип 1-2-3 ( <i>Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)</i> )	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 0	відсутня	1
49,2	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1	відсутня	1
49,3	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1 – 2	відсутня	1
50	Стійкість до <i>Phytophthora capsici</i>	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до <i>Cucumber Mosaic Virus (CMV)</i>	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до <i>Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)</i>	відсутня	1
53	Стійкість до <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 57 т/га, тривалість періоду до досягнення – 115 діб, товщина стінки плоду – 6 мм, середня маса плоду – 60 г, вміст загального цукру – 9,4%, вміст клітковини – 2,8%, вміст сухої речовини – 5,6%, стійкість проти ураження хворобами, бал (1-9): анtrakноз – 5, гниль верхівкова – 5, вірусні хвороби – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** закритий ґрунт.