

**Вид:** Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

**Заявка № 15113022 Назва сорту:** Даймос **Заявник (код):** 2088 **Власник сорту (код):** 2088

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.03.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170562**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	наявні	9
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	ознака не визначається	0
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	слабка	3
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: форма	овальна	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	дуже слабка	1
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3
18	Листок: глянуватість	слабка	3
19	Квітконіжка: положення	поникле	3
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірна	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	прямокутна	5
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірна	5
35	Плід: глянуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	середня	5
38	Плід: форма верхівки	дуже увігнута	5
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5
40	Плід: кількість долей	переважно чотири і більше	5
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	пізній	7
47	Час досягання	пізній	7
48,1	Стійкість проти Tobacco virus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	відсутня	1
48,2	Стійкість проти Tobacco virus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	відсутня	1
48,3	Стійкість проти Tobacco virus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	відсутня	1
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	наявна	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 105 т/га, тривалість періоду до досягання – 110 діб, товщина стінки плоду – 7 мм, середня маса плоду – 322 г, вміст вітаміну С – 160 мг%, вміст загального цукру – 3,1%, вміст клітковини – 2,0%, вміст сухої речовини – 8%, стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): антракноз – 8, гниль верхівкова – 8, вірусні хвороби – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** закритий ґрунт.