

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 14122005 Назва сорту: Бохан **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.02.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170006

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|--------------------------|-----|
| 1 | Супліддя | одноросткове | 1 |
| 2 | Паросток: червоне забарвлення гіпокотиля | наявне | 9 |
| 3 | Листок: положення черешка | напівпряме | 3 |
| 4 | Листок: положення пластинки | напівпряме | 3 |
| 5 | Листок: за довжиною (включно з черешком) | короткий | 3 |
| 6 | Листкова пластинка: за довжиною | коротка | 3 |
| 7 | Листкова пластинка: за шириноро | вузька | 3 |
| 8 | Листкова пластинка: форма | еліптична | 5 |
| 9 | Листкова пластинка: колір | в основному зелений | 1 |
| 10 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення | помірне | 5 |
| 11 | Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок | сильне | 7 |
| 12 | Листкова пластинка: хвильастість краю | сильна | 7 |
| 13 | Листкова пластинка: пухирчастість | помірна | 5 |
| 14 | Листковий черешок: за ширину основи | середній | 5 |
| 15 | Листковий черешок: основний колір зворотнього боку | пурпурний | 4 |
| 16 | Коренеплід: загиблість у ґрунті | глибока | 7 |
| 17 | Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі | округла | 3 |
| 18 | Коренеплід: за довжиною | короткий | 3 |
| 19 | Коренеплід: за ширину | середній | 5 |
| 20 | Коренеплід: відношення довжина / ширина | середнє | 3 |
| 21 | Коренеплід: форма основи | загострена | 1 |
| 22 | Коренеплід: окорковіння шкірки | помірне | 5 |
| 23 | Коренеплід: колір шкірки | червонувато-пурпурний | 3 |
| 24 | Коренеплід: основне забарвлення м'якоті | пурпурове | 4 |
| 25 | Коренеплід: інтенсивність забарвлення м'якоті | темна | 7 |
| 26 | Коренеплід: виявлення кілець | помірне | 5 |
| 27 | Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби) | відсутня або дуже слабка | 1 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Вміст сухої речовини в коренеплоді – 11%. Середній урожай коренеплодів – 75 т/га. Вміст загального цукру – 8,1 %. Маса товарного коренеплоду – 220 г. Тривалість періоду від повних сходів до початку досягнення – 115 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ.