

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 14122004 Назва сорту: Манзу **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.02.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170005

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Супліддя	одноросткове	1
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Листок: положення черешка	напівпряме	3
4	Листок: положення пластинки	напівпонижле	7
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	середній	5
6	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
7	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	5
9	Листкова пластинка: колір	зелений або червоний	2
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	дуже сильне	9
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	сильна	7
13	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
14	Листковий черешок: за шириною основи	середній	5
15	Листковий черешок: основний колір зворотнього боку	пурпуровий	4
16	Коренеплід: заглибленість у ґрунті	глибока	7
17	Коренеплід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
18	Коренеплід: за довжиною	середній	5
19	Коренеплід: за шириною	середній	5
20	Коренеплід: відношення довжина / ширина	середнє	3
21	Коренеплід: форма основи	загострена	1
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	помірне	5
23	Коренеплід: колір шкірки	червонувато-пурпуровий	3
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4
25	Коренеплід: інтенсивність забарвлення м'якоті	темна	7
26	Коренеплід: виявлення кілець	сильне	7
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сіви)	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Вміст сухої речовини в коренеплоді – 11%. Середній урожай коренеплодів – 75 т/га. Вміст загального цукру – 8,2 %.
Маса товарного коренеплоду – 210 г. Тривалість періоду від повних сходів до початку достигання – 112 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ.