

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 14122002 Назва сорту: Ренова **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.02.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170004

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Супліддя	багаторосткове	2
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Листок: положення черешка	пряме	1
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	середній	5
6	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
7	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	5
9	Листкова пластинка: колір	в основному зелений	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
13	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
14	Листковий черешок: за шириною основи	середній	5
15	Листковий черешок: основний колір зворотнього боку	пурпуровий	4
16	Коренеплід: заглибленість у ґрунті	середня	5
17	Коренеплід: форма у повздовжньому розрізі	вужковидовжена	5
18	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
19	Коренеплід: за шириною	вужкий	3
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширина	велике	5
21	Коренеплід: форма основи	загострена	1
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	слабке	3
23	Коренеплід: колір шкірки	червонувато-пурпуровий	3
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	червоне	3
25	Коренеплід: інтенсивність забарвлення м'якоті	помірна	5
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сіви)	сильна	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 28 т/га. Маса товарного коренеплоду – 300 г. Тривалість періоду від повних сходів до початку достигання – 125 діб. Вміст сухої речовини в плоді – 19 %. Вміст загального цукру – 12 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт.