

**Вид:** Диня звичайна *Cucumis melo* L.

**Заявка № 13147007 Назва сорту:** ІБЕРІКО **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.02.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 170015

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	середній	5
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	великий	7
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5
4	Листкова пластинка: розмір	середній	5
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	помірна	5
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	середня	5
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3
9	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	горизонтальне	7
11	Черешок: за довжиною	середній	5
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромонециїні	2
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	жовтувато-зелений	2
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3
15	Молодий плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1
16	Молодий плід: розмір крапок	ознака не визначається	0
17	Молодий плід: контрастність крапок і основного забарвлення	ознака не визначається	0
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	відсутня або дуже слабка	1
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	ознака не визначається	0
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	мале	3
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на пізніх стадіях розвитку плоду	2
24	Плід: за довжиною	середній	5
25	Плід: діаметр	малий	3
26	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	помірноеліптична	2
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за досягання)	жовте	2
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за досягання)	сильна	7
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за досягання)	оранжевий	4
32	Плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1
33	Плід: розмір крапок	ознака не визначається	0
34	Плід: забарвлення крапок	ознака не визначається	0
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	ознака не визначається	0
36	Плід: щільність плям	нешільна	3
37	Плід: розмір плям	малий	3
38	Плід: бородавки	відсутні	1
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	сильна	7
40	Плід: форма основи	загострена	1
41	Плід: форма верхівки	загострена	1
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5
43	Плід: боріздки	відсутні або дуже слабо	1
44	Плід: боріздки за шириною	ознака не визначається	0
45	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0
46	Плід: забарвлення боріздок	ознака не визначається	0
47	Плід: зморшкуватість поверхні	сильна	7
48	Плід: коркове утворення	відсутнє	1
49	Плід: корковий шар за товщиною	ознака не визначається	0
50	Плід: візерунок коркового утворення	ознака не визначається	0
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	ознака не визначається	0
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	ознака не визначається	0
53	Плід: м'якоть в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжеве	5
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	помірна	5
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0
57	Плід: консистенція м'якоті	середня	5
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	жовтий	1
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	слабка	3
60	Насінина: за довжиною	коротка	3
61	Насінина: за шириною	середня	5

№	Ознака	Проявлення	Код
62	Насінина: форма	подібна до форми кедрового горішка	2
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	слабка	3
65	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5
67	Час досягання	середній	5
68	Термін зберігання плоду	короткий	3
69,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	ознака не визначалась	0
69,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
69,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i> : Паса 2	ознака не визначалась	0
69,4	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i> : Паси 1-2	ознака не визначалась	0
70,1	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ( <i>Podosphaera xanthii</i> ) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0
70,2	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ( <i>Podosphaera xanthii</i> ) (борошнистої роси): Паса 2	ознака не визначалась	0
70,3	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ( <i>Podosphaera xanthii</i> ) (борошнистої роси): Паса 5	ознака не визначалась	0
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> ( <i>Golovinomyces cichoracearum</i> ) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0
72	Стійкість до колоній ( <i>Aphis gossypii</i> )	ознака не визначалась	0
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні ( <i>ZYMV</i> )	ознака не визначалась	0
74,1	Стійкість до кільчастого вірусу папайї ( <i>PRSV</i> )	ознака не визначалась	0
74,2	Стійкість до кільчастого вірусу папайї ( <i>PRSV</i> ): Паса E2	ознака не визначалась	0
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині ( <i>MNSV</i> )	ознака не визначалась	0
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка ( <i>CMV</i> )	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна урожайність – 40 т/га, період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання плодів – 100 діб, період від повних сходів до першого збирання – 40 діб, вміст сухої речовини в плодах – 20%, вміст загального цукру – 14%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.