

Вид: Помідор юстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 16115012 Назва сорту:** Малинка Стар **Заявник (код):** 2226 **Власник сорту (код):** 2226**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №**Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.03.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170586****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотия	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індегерміантний	2
3	Лише детермінантні сорти: Рослина: кількість міжузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Лише індегерміантні сорти: Стебло: міжузля за довжиною між 1 і 4 сучвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсиченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Сучвіття: за типом	переважно не галузисте	1
17	Квітка: фасція (перша квітка сучвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	довга	7
22	Плід: розмір	дуже великий	9
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3
24	Плід: форма повзувального розрізу	сплюснута	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: загиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	великий	7
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до пlesкатої	2
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	великий	7
32	Плід: перикарпій за товщиною	товстий	7
33	Плід: кількість насіниневих камер	чирина, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плеце (перед досягненням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	малий	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досягненням)	помірне	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досягненням)	слабка	3
38	Плід: забарвлення (за досягненням)	рожеве	4
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягненням)	рожеве	4
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: термін лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягнення	дуже ранній	1
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягненням)	середній	5
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Група 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	відсутня	1
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	відсутня	1
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи Е	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9
51,2	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1
53	Стійкість проти <i>Rhizoctonia lycopersici</i>	відсутня	1
54	Стійкість проти <i>Stemphylium spp.</i>	відсутня	1
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	відсутня	1
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1

№	Ознака	Проявлення	Код
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1
62	Лише індeterminантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5
64	Плід: глянсуватість шкірки	сильна	3
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна урожайність – 72 т/га, вміст каротину – 4 мг%, вміст сухої речовини в плоді – 7%, вміст вітаміну С – 9 мг%, вміст загального цукру – 7%, загальна кислотність – 0,4%, маса товарного плоду – 165 г, період від повних сходів до початку дозрівання – 80 діб, період плодоношення – 90 діб, стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): віруси – 6, гнилі – 8, альтернаріоз – 8, фітофтороз – 7, стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): попелиця – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.