

**Вид:** Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*

**Заявка № 15118004 Назва сорту:** Ескала **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 19.05.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170957**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
3	Сім'ядолі: розмір	малий	3
4	Листкова розетка: за шириною основи	вузька	3
5	Листок: положення у просторі	напівпряме	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листкова пластинка: форма	оберненояцеподібна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	середня	5
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
17	Коренеплід: за товщиною	середній	5
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	тонкий	3
19	Коренеплід: форма	округла	2
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3
21	Коренеплід: форма основи	округла	4
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	багряне	2
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: кора за товщиною	середня	5
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	напівпрозоре біле	1
28	Час досягання	ранній	3
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 55 т/га. Тривалість періоду до досягання – 23 доби. Середня маса плоду – 30 г. Вміст сухої речовини – 5,1 %. Вміст вітаміну С – 31 мг%. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла – 7, гниль мокра – 8, чорна ніжка – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** закритий ґрунт.