

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 15096010 Назва сорту: Сонсма Заявник (код): 1730 Власник сорту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.02.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170042

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	опуклий	3
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутній або дуже слабкий	1
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5
13	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	кутасто-яйцеподібна	7
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	рівна	2
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: діаметр	малий	3
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до основи	3
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	слабка	3
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	слабке	3
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	нешільна	3
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	коротка	3
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	дуже ранній	1
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	ранній	3
35	Чоловіча стерильність	відсутня	1
36	Спійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 60 т/га. Період від сівби до початку досягання – 90 діб. Лежкість – 5 балів. Вміст вітаміну С – 32мг%. Вміст загального цукру – 4%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.