

Вид: Капуста брюссельська *Brassica oleracea* L. var. *gemmifera* DC.

Заявка № 14099002 Назва сорту: Касіопея **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.02.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170048

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|--------------------------------|-----|
| 1 | Рослина: за висотою | висока | 7 |
| 2 | Рослина: тенденція до формування головки | слабка | 3 |
| 3 | Листкова пластинка: за розміром | середня | 5 |
| 4 | Листкова пластинка: за довжиною | середня | 5 |
| 5 | Листкова пластинка: забарвлення | зелене | 1 |
| 6 | Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення | помірне | 5 |
| 7 | Листкова пластинка: наявність воскового нальоту | помірний | 5 |
| 8 | Листкова пластинка: здатність приймати форму чашки | рівна | 5 |
| 9 | Листкова пластинка: пухирчастість | помірна | 5 |
| 10 | Листкова пластинка: відблиск краю | відсутній | 1 |
| 11 | Черешок: положення | горизонтальний | 5 |
| 12 | Черешок: довжина у порівнянні з листковою пластинкою | однаковий | 5 |
| 13 | Черешок: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 14 | Плід: форма у поздовжньому розрізі | яйцеподібна | 2 |
| 15 | Плід: забарвлення | зелене | 1 |
| 16 | Плід: інтенсивність забарвлення | помірне | 5 |
| 17 | Плід: щільність за збиральної стиглості | помірна | 5 |
| 18 | Стебло: розміщення плодів | помірно | 5 |
| 19 | Час збиральної стиглості | середній | 5 |
| 20 | Зовнішній вигляд колони плодів | від конічного до циліндричного | 2 |
| 21 | Чоловіча стерильність | наявна | 9 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність – 32 т/га. Період від повних сходів до початку досягання – 90 діб. Тривалість періоду плодоношення – 26 діб. Вміст загального цукру – 7,2 %. Вміст вітаміну С – 47,1 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт.