

**Вид:** Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

**Заявка № 15120005 Назва сорту:** Ломерія **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.05.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170972**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядол за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	широкоеліптична	7
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	великий	7
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянистоголового типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	середній	5
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	еліптична	2
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	жовтуватий	2
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірна	5
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глясуватість верхнього боку	помірна	5
25	Листок: пухирчастість	помірна	5
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	синусоїдна (городчаста)	1
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1
33	Пазушне жилкування	слабке	3
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	середній	5
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	висока	7
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1
41	Стійкість проти попелици (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	ознака не визначалася	0
42	Стійкість проти <i>fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалася	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 24 т/га. Тривалість періоду до досягання – 65 діб. Стійкість до хвороб, балів (1-9): несправжня борошниста роса – 8, борошниста роса – 8, біла гниль – 8, септоріоз – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.