

Вид: Капуста савойська *Brassica oleracea* L. var. *sabauda* DC.

Заявка № 14100001 Назва сорту: Блістра Заявник (код): 1997 Власник сорту (код): 1997

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.02.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170052

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1.1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1.3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	середня	5
2.1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	ознака не визначається	0
2.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2.3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	великий	7
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	середній	5
4	Рослина: положення зовнішніх листків	сланкі	5
5.1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5.3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	середній	5
6	Зовнішній листок: форма пластинки	широкояцевидна	2
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2
8.1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
8.2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірна	5
9.1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
9.2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	середня	5
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	зелений	2
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	темне	7
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвильості краю	слабка	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	округла	3
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	рівна	2
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: за діаметром	середня	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покрита	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	помірна	5
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	середня	5
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33.1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стигlosti	ознака не визначається	0
33.2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стигlosti	ознака не визначається	0
33.3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стигlosti	пізний	7
34	Час розтріскування головки після досягнання	пізний	7
35	Чоловіча стерильність	наявна	9
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність – 34 т/га, період від повних сходів до початку досягнання – 95 діб, тривалість періоду плодоношення – 24 доби, вміст сухої речовини – 6,7 %, вміст загального цукру – 4,5 %, вміст вітаміну С – 39 МГ%, товарна врожайність – 31 т/га.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт.