

Вид: Салат посівний ромен *Lactuca sativa* var. *longifolia* L.**Заявка № 15546007 Назва сорту:** Корбана**Заявник (код):** 840**Власник сорту (код):** 840**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 19.05.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170979****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насініна: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	великі	7
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	пряме	1
6	Листкова пластина: за розсіченістю краю	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	великий	7
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини	середнє	5
10	Головка: за щільністю	нешільна	3
11	Головка: розмір	великий	7
12	Лише для сортів маслянисто-головчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначалась	0
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	вузькоеліптична	1
14	Листок: за товщиною	товстий	7
15	Листок: положення за збиральної стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів	пряме	1
16	Листок: форма	широкоромбоподібна	8
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірне	5
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
24	Листок: глянсуватість з верхнього боку	помірна	5
25	Листок: пухирчастість	помірна	5
26	Листок: розмір пухирів	середній	5
27	Листкова пластина: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
28	Листкова пластина: розсіченість краю верхівки	відсутня	1
29	Листкова пластина: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначалась	0
30	Листкова пластина: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначалась	0
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластина: тип розсіченості	ознака не визначалась	0
32	Листкова пластина: жилкування	невіялоподібне	1
33	Пазушне гілкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	ранній	3
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	висока	7
37	Рослина: фасція (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасції (під час цвітіння)	ознака не визначалась	0
39	Стійкість до борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Izolate B1:16	ознака не визначалась	0
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	ознака не визначалась	0
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна урожайність – 34 т/га. Середня маса плоду – 600 г. Щільність головки – 8 балів. Тривалість періоду до досягнення – 39 діб. Лежкість – 93 %. Стійкість до хвороб: несправжня борошниста роса – 8 балів, борошниста роса – 7 балів, антракноз – 7 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.