

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis***Заявка № 16101001 Назва сорту:** Вассало **Заявник (код):** 2226 **Власник сорту (код):** 2226**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №**Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.02.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170060****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	висока	7
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5
4	Листок: положення	напівпрямe	3
5	Листок: за довжиною	довгий	7
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	наявна	9
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	блакитно-зелене	3
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	слабка	3
11	Листок: закручування верхівки	помірне	5
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2
13	Листок: пухирчатість	помірна	5
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: діаметр	середній	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно широко-еліптична	2
20	За винятком сортів з трикутною головкою: Головка: закручування краю	помірне	5
21	Головка: забарвлення	білувате	1
22	Головка: горбкуватість	слабка	3
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стигlosti	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	біле	1
26	Скоростиглість: за весняного садіння	від ранньої до середньої	4
27	Скоростиглість: за літнього садіння	ознака не визначалась	0
28	Чоловіча стерильність	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 35 т/га, товарна врожайність – 33 т/га, період від повних сходів до початку достигання – 75 діб, період плодоношення – 20 діб, вміст білка – 6 %, вміст вітаміну С – 12 мг %, вміст загального цукру – 7 %, вміст сухої речовини – 14 %, стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.