

Вид: Цикорій салатний (ендивій) *Cichorium endivia* L.

Заявка № 15121002 Назва сорту: Мірна **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.05.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171073

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 1 | Рослина: діаметр | середній | 5 |
| 2 | Рослина: габітус | ознака не визначається | 0 |
| 3 | Рослина: форма верхньої частини поздовжнього розрізу | заокруглена | 2 |
| 4 | Серцевина: тенденція до знебарвлення | помірна | 2 |
| 5 | Листок: вигин верхньої частини | сильний | 3 |
| 6 | Листок: за довжиною | середній | 5 |
| 7 | Лише для сортів типу ескаріоль: Листок: за шириною | середній | 5 |
| 8 | Лише для сортів кучерявого типу: Листок: за шириною | ознака не визначається | 0 |
| 9 | Лише для сортів типу ескаріоль: Листок: форма | широкооберненойцеподібна | 5 |
| 10 | Листок: забарвлення | жовтувато-зелене | 2 |
| 11 | Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: розсіченість за глибиною | мілька | 3 |
| 12 | Лише для сортів кучерявого типу. Листок: жилкування | ознака не визначалась | 0 |
| 13 | Лише для сортів кучерявого типу. Листок: частки за довжиною | ознака не визначається | 0 |
| 14 | Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зубчастість краю | помірна | 2 |
| 15 | Лише для сортів кучерявого типу. Листок: зубчастість краю за довжиною | ознака не визначалась | 0 |
| 16 | Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: хвилястість краю | помірна | 5 |
| 17 | Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зморшкуватість | помірна | 5 |
| 18 | Лише для сортів кучерявого типу. Листок: відношення довжина частини листка без часток/загальна довжина листка | ознака не визначається | 0 |
| 19 | Центральна жилка листка: за шириною біля основи | середня | 5 |
| 20 | Лише для сортів кучерявого типу. Листок: антоціанове забарвлення біля основи | ознака не визначається | 0 |
| 21 | Стебло: за висотою | середнє | 5 |
| 22 | Стебло: фасціація | нявна | 9 |
| 23 | Стебло: положення бічних пагонів | пряме | 1 |
| 24 | Лише для сортів типу ескаріоль. Стебло: форма прилистків | вузькоеліптична | 1 |
| 25 | Квітка: забарвлення | біле | 1 |
| 26 | Час споживчої стиглості | ранній | 3 |
| 27 | Час стрілкування | середній | 5 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 30 т/га. Період від сходів до збирання врожаю – 42 доби. Стійкість проти хвороб, балів (1–9): пероноспорозом – 8, церкоспорозом – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.