

Вид: Цикорій салатний (ендивій) *Cichorium endivia* L.

Заявка № 15121001 Назва сорту: Парманс **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.05.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171072

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: діаметр	середній	5
2	Рослина: габітус	горизонтальний	3
3	Рослина: форма верхньої частини поздовжнього розрізу	заокруглена	2
4	Серцевина: тенденція до знебарвлення	помірна	2
5	Листок: вигин верхньої частини	сильний	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Лише для сортів типу ескаріоль: Листок: за шириною	середній	5
8	Лише для сортів кучерявого типу: Листок: за шириною	ознака не визначається	0
9	Лише для сортів типу ескаріоль: Листок: форма	широкооберненояцеподібна	5
10	Листок: забарвлення	жовтувато-зелене	2
11	Лише для сортів типу ескаріоль: Листок: розсіченість за глибиною	середня	5
12	Лише для сортів кучерявого типу: Листок: жилкування	ознака не визначалась	0
13	Лише для сортів кучерявого типу: Листок: частки за довжиною	ознака не визначається	0
14	Лише для сортів типу ескаріоль: Листок: зубчастість краю	помірна	2
15	Лише для сортів кучерявого типу: Листок: зубчастість краю за довжиною	ознака не визначалась	0
16	Лише для сортів типу ескаріоль: Листок: хвилястість краю	помірна	5
17	Лише для сортів типу ескаріоль: Листок: зморшкватість	помірна	5
18	Лише для сортів кучерявого типу: Листок: відношення довжина частини листка без часток/загальна довжина листка	ознака не визначається	0
19	Центральна жилка листка: за шириною біля основи	широка	7
20	Лише для сортів кучерявого типу: Листок: антоціанове забарвлення біля основи	ознака не визначається	0
21	Стебло: за висотою	середнє	5
22	Стебло: фасціація	нявна	9
23	Стебло: положення бічних пагонів	напівпряме	3
24	Лише для сортів типу ескаріоль: Стебло: форма прилистків	округла	3
25	Квітка: забарвлення	світло-рожеве	2
26	Час споживчої стиглості	середній	5
27	Час стрілкування	пізній	7

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 28 т/га. Період від сходів до збирання врожаю – 43 доби. Стійкість проти хвороб, балів (1–9): пероноспорозом – 8, церкоспорозом – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.