

Вид: Полин естрагон *Artemisia dracunculus* L.

Заявка № 13132003 **Назва сорту:** Сибіряк **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.05.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170904

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	компактний	1
2	Рослина: за висотою	висока	7
3	Рослина: кількість генеративних стебел	велика	7
4	Рослина: тип галуження	більше трьох	4
5	Рослина: за типом розміщення листків на пагонах	чергові подвійні	2
6	Стебло: за товщиною	тонке	3
7	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
8	Стебло: забарвлення	зеленувато-коричнє	3
9	Рослина: пагони I-го порядку за довжиною	довгі	7
10	Рослина: пагони II-го порядку	наявні	9
11	Рослина: пагони III-го порядку	наявні	9
12	Рослина: облиственість	сильна	7
13	Листок: форма листкової пластинки	ланцетна	2
14	Листок: забарвлення	сизувате	5
15	Листок: тип прикріплення	сидячий	1
16	Листок: за формою основи листкової пластинки	звужена	2
17	Листок: опушення	наявне	9
18	Листок: за довжиною	довгий	7
19	Листок: за шириною	широкий	7
20	Суцвіття: за щільністю	щільне	7
21	Квітка: забарвлення	жовте	2
22	Насінина (сім'янка): забарвлення	світло-коричнє	2
23	Сім'янка: маса 1000 шт.	велика	7
24	Рослина: тривалість періоду до плодоношення	довга	7
25	Рослина: вміст ефірної олії	середній	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин – 100 см. Тривалість періоду від відростання до технічної стиглості (кінець бутонізації–початок цвітіння) – 90 діб. Урожайність надземної маси – 21,2 т/га. Вміст ефірної олії у % на сиру масу – 0,25. Вміст ефірної олії у % на абсолютно суху масу – 1,04. Вміст метилхавіколу в ефірній олії – 14,5 %, вміст сабінену в ефірній олії – 33,67 %, вміст метилевгенолу в ефірній олії – 25,3 %, вміст елеміцину в ефірній олії – 19,8 %. Зимостійкість та посухостійкість – 9 балів. Стійкість до ураження борошнистою росою – 6 балів, проти пошкодження попелицею – 8 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.