

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.**Заявка № 14294012 Назва сорту:** Флорида Фортuna **Заявник (код):** 1282 **Власник сорту (код):** 1282**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.03.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 171057****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|----------------------------|-----|
| 1 | Рослина: форма росту | пряма | 1 |
| 2 | Рослина: щільність листків | помірно щільна | 5 |
| 3 | Рослина: сила росту | середня | 5 |
| 4 | Рослина: положення суцвіття відносно листків | на рівні | 2 |
| 5 | Рослина: кількість вусів | багато | 7 |
| 6 | Вуса: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 7 | Вуса: щільність опущення | помірне | 5 |
| 8 | Листок: за розміром | середній | 5 |
| 9 | Листок: забарвлення верхнього боку | зелене | 3 |
| 10 | Листок: пухирчастість | відсутня або слабка | 3 |
| 11 | Листок: блиск | помірний | 5 |
| 12 | Листок: строкатість | відсутня | 1 |
| 13 | Верхіковий листочок: відношення довжина/ширина | велике | 3 |
| 14 | Верхіковий листочок: форма основи | гостра | 1 |
| 15 | Верхіковий листочок: форма зазублення краю | городчаста | 3 |
| 16 | Верхіковий листочок: форма поперечного перерізу | плеската | 2 |
| 17 | Черешок: за довжиною | середній | 5 |
| 18 | Черешок: розташування волосків | злегка спрямовані донизу | 2 |
| 19 | Прилисток: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 20 | Суцвіття: кількість квіток | середня | 5 |
| 21 | Квітконіжка: розташування волосків | злегка спрямовані донизу | 2 |
| 22 | Квітка: за діаметром | середня | 5 |
| 23 | Квітка: розташування пелюсток віночка | перекриваються | 3 |
| 24 | Квітка: розмір чашечки відносно віночка | однакова | 2 |
| 25 | Квітка: тичинки | наявні | 9 |
| 26 | Пелюстка віночка: довжина стосовно ширини | однакова | 3 |
| 27 | Пелюстка: забарвлення верхнього боку | зеленувато-біле | 1 |
| 28 | Плід: відношення довжина/ширина | більша | 4 |
| 29 | Плід: за розміром | великий | 7 |
| 30 | Плід: форма | конічна | 2 |
| 31 | Плід: різниця за формою між верхіковими та іншими плодами | помірна | 5 |
| 32 | Плід: забарвлення | червоне | 5 |
| 33 | Плід: рівномірність забарвлення нерівномірний | рівномірний або ледь | 1 |
| 34 | Плід: глянсуватість | помірна | 5 |
| 35 | Плід: нерівність поверхні | відсутня або ледь виражена | 1 |
| 36 | Плід: ширина вільної від зерняток зони | відсутнє або дуже вузька | 1 |
| 37 | Плід: розташування зерняток | заглиблені | 1 |
| 38 | Плід: заглиблення чашечки | заглиблена | 1 |
| 39 | Плід: положення чошолистків | прилягаючі | 3 |
| 40 | Плід: розмір чашечки порівняно з діаметром плоду | однакова | 3 |
| 41 | Плід: прилягання чашечки до плоду | помірне | 5 |
| 42 | Плід: твердість мякоті | тверда | 7 |
| 43 | Плід: забарвлення мякоті (за винятком ядра) | світло-червоне | 4 |
| 44 | Плід: забарвлення ядра мякоті | світло-червоне | 2 |
| 45 | Плід: повторяна комірка | відсутня або дуже мала | 1 |
| 46 | Час початку цвітіння | ранній | 3 |
| 47 | Час початку досягнання | ранній | 3 |
| 48 | Рослина: за типом плодоношення | частково ремонтантна | 2 |

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Середня урожайність сорту – 22 т/га. Середня маса ягоди – 23 г. Вміст в ягодах вітаміну С – 60,0 мг/100 г, загального цукру – 9,0%, пектинових речовин – 1,0%, сухої речовини – 7,0%, загальна кислотність – 1,1%. Стійкість до плодової гнилі, бурої плямистості та білої плямистості – 6 балів, до борошнистої роси – 7 балів. Стійкість до пошкодження малиново-сунничним довгоносиком та сунничним кліщем – 6 балів. Зимостійкість – 8 балів, посухостійкість – 7 балів. Група достигання рання. Транспортабельність ягід – 8 балів, дегустаційна оцінка – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт, Степ, Лісостеп, Полісся.