

Вид: Лілійник *Hemerocallis* L.

Заявка № 14326004 Назва сорту: Родзинка **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.05.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170873

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоідність	диплоїд	2
2	Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт)	напівспляча	2
3	Рослина: час початку вегетації	середній	5
4	Рослина: за висотою	середня	5
5	Рослина: габітус	компактний	1
6	Листок: положення у просторі	поникле біля верхівки	2
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: забарвлення	помірно зелене	2
10	Квітконос: розташування відносно листків	виступаючий над листками	2
11	Квітконос: залистіяність	наявна	9
12	Суцвіття: за щільністю	щільне	9
13	Суцвіття: приквіткі	наявні	9
14	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
15	Час цвітіння	середньоранній	3
16	Рослина: тип цвітіння	звичайний	1
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1
18	Рослина: тривалість цвітіння	мала	3
19	Квітка: кількість на рослині	середня	5
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	середня	5
21	Квітка: діаметр	середній	5
22	Квітка: за типом	повна	3
23	Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: форма	ознака не визначається	0
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	червоне	4
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини	однокольорова	1
26	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	оранжево-коричневе	45
27	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13
28	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	оранжево-коричневе	45
29	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13
30	Квітка: візерунок	пліката	15
31	Квітка: основне забарвлення візерунка на частках оцвітини	коричнево-червоне	25
32	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток: Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
33	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток: Квітка: третинне забарвлення	ознака не визначається	0
34	Лише для двотонних, оберненодвотонних, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: первинне забарвлення	ознака не визначається	0
35	Лише для двотонних, оберненодвотонних, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
36	Квітка: аромат	слабкий	2
37	Оцвітина: відносно розташування часток	дотичне	3
38	Оцвітина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки	підняті догори	1
39	Оцвітина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті	3
40	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	тупа	4
41	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	тупа	4
42	Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки	хвиляста	2
43	Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки	рівна	1
44	Квітка: характер поверхні внутрішньої пелюстки	зморшківата	2
45	Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки	зморшківата	2
46	Квітка: трубка оцвітини за довжиною	коротка	1
47	Квітка: за довжиною тичинки	середня	5
48	Тичинка: основне забарвлення	жовто-оранжеве	13
49	Тичинка: забарвлення пиляків	рожево-коричневе	2
50	Пилок: забарвлення	помаранчеве	3
51	Пилок: життєздатність	висока	7
52	Плід: відсоток плодоцвітіння	високий	7
53	Стовпчик: основне забарвлення	жовто-оранжеве	13
54	Квітка: положення приймочки відносно пиляків	вище	7
55	Приймочка: забарвлення	жовто-оранжеве	13
56	Рослина: тривалість періоду вегетації	середня	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини – 65 см. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння – 88 днів. Тривалість цвітіння суцвіття – 20 днів. Тривалість цвітіння рослини – 28 днів. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації відсутнє. Декоративність – 96 балів. Коефіцієнт вегетативного розмноження – 25. Зимостійкість – 9 балів, посухостійкість – 8 балів. Стійкість проти пошкодження комариком лілійника та паутинним кліщем – 9 балів. Стійкість проти ураження гнилями кореневої шийки та хлорозом – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.