

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка № 13109012 Назва сорту: Мірна **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.02.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170175

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: за шириною	середня	5
2	Листок: положення	горизонтальне	5
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	довгий	7
4	Листок: розсіченість	помірна	5
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	вузькотрикутна	4
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	сильна	7
12	Коренеплід: форма плеча	від плескатої до округлої	2
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	сильно загострений	3
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	сильна	7
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	середня	5
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	середня	5
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	темніше	3
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	слабка	3
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	ознака не визначається	0
29	Рослина: тенденція до стрілкування	ознака не визначалась	0
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	середня	2
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	коричневі пиляки	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стиглості – 110 діб. Вміст загального цукру – 6,5 %. Вміст сухої речовини – 12,5 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ.