

**Вид:** Морква *Daucus carota* L.

**Заявка № 14109008 Назва сорту:** Тангеріна

**Заявник (код):** 861

**Власник сорту (код):** 861

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.02.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 170180

#### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: за ширину	широкі	7
2	Листок: положення	горизонтальне	5
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	довгий	7
4	Листок: розсіченість	тонка	3
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5
8	Коренеплід: за ширину	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	майже трикутна	3
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	сильна	7
12	Коренеплід: форма плеча	плескаті	1
13	Коренеплід: кінчики (за повного розвитку)	сильно загострений	3
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	сильна	7
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	мала	3
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	слабка	3
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5
22	Коренеплід: забарвлення флоеми	оранжеве	3
23	За винятком сортів із білою флоемою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоеми	помірна	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоеми	темніше	3
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	слабка	3
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1
27	Тильки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	ознака не визначається	0
29	Рослина: тенденція до стрілкування	слабка	3
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	середній	5
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	середня	2
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові піляки	2

#### За інформацією наданою заявником:

##### - показники господарської придатності

Товарна урожайність – 105 т/га. Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стигlosti – 110 діб. Вміст каротину – 24,5 мг%. Вміст загального цукру – 10 %. Вміст сухої речовини – 7,5%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Полісся, Лісостеп, Степ.