

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка № 14109003 Назва сорту: Цідера **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.02.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170178

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: за шириною	середня	5
2	Листок: положення	напівпряме	3
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5
4	Листок: розсіченість	помірна	5
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	від вузькотрикутної до вузьковидовженої	5
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до кінчної форми	сильна	7
12	Коренеплід: форма плеча	від плескатої до округлої	2
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	мала	3
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	слабка	3
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	середній	5
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	сильна	7
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	однакове	2
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	відсутнє або дуже слабка	1
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ранній	3
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	ранній	3
29	Рослина: тенденція до стрілкування	ознака не визначалась	0
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мала	1
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна урожайність – 35 т/га. Тривалість періоду до досягання – 145 діб. Вміст сухої речовини – 11,5 %. Вміст загального цукру – 5,8 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт.