

**Вид:** Огірок посівний *Cucumis sativus* L.**Заявка № 16110003 Назва сорту:** Нами**Заявник (код):** 2226**Власник сорту (код):** 2226**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.02.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170192****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

<b>№</b>	<b>Ознака</b>	<b>Проявлення</b>	<b>Код</b>
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індегермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжузлів	середня	5
4	Листкова пластина: положення	горизонтальне	2
5	Листкова пластина: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластина: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластиинки	помірне	5
7	Листкова пластина: форма апікальної лопаті	гостра	1
8	Листкова пластина: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7
9	Листкова пластина: пухирчатість	слабка	3
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластина: зубчастість краю	дуже слабка	1
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	субгіномоєїність	2
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 3 або 4	5
15	Завязь: забарвлення зовнішнього покриву	бліле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	малий	3
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи	тупа	3
23	Лиші для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	тупа	2
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стигlosti	зелене	3
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: борозенки	наявні	9
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	волоски і шипики	2
32	Плід: покрив за щільністю	нештільний	3
33	Лиші сорти з блідою завяззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву.	бліле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	малий	3
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3
37	Плід: плями	наявні	9
38	Плід: характер поширення плям	переважно смугами	2
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/3 довжини	1
40	Плід: щільність плям	нештільна	3
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стигlosti	жовте	2
44	Стійкість проти 1) <i>Cladosporium cicutae</i>	відсутня	1
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i> )	високо стійкий	3
46	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	високо стійкий	3
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	сприйнятливий	1
48	Стійкість проти бурої плямистості ( <i>Corynephora melonis</i> )	відсутня	1
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка ( <i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)</i> )	відсутня	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна урожайність – 26 т/га, вміст сухої речовини в плоді – 6%, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стигlosti – 55 діб, період плодоношення – 35 діб, стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): анtraknоз – 6, бактеріоз – 6, борошниста роса – 5, пероноспороз – 6, віруси – 7, стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): попелиця – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** закритий ґрунт.