

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 16110001 Назва сорту: Ромоло **Заявник (код):** 2226 **Власник сорту (код):** 2226

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.02.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170191

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	субгіномоноеційність	2
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	малий	3
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	тупа	2
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: борозенки	наявні	9
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	помірний	5
31	Плід: тип покриву	волоски і шипики	2
32	Плід: покрив за щільністю	дуже нещільний	1
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	малий	3
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3
37	Плід: плями	відсутні	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/3 довжини	1
40	Плід: щільність плям	нещільна	3
41	Плід: наліт	слабкий	3
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2
44	Стійкість проти 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	відсутня	1
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	високо стійкий	3
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	високо стійкий	3
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	сприйнятливий	1
48	Стійкість проти бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (<i>CVYV</i>)	відсутня	1
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)</i>)	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 18 т/га, вміст сухої речовини в плоді – 4,2%, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості – 42 доби, період плодоношення – 60 діб, стійкість проти ураження хворобами, бал (1-9): антракноз – 7, бактеріоз – 9, борошниста роса – 7, пероноспороз – 9, віруси – 9, стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1-9): попелиця – 1.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.