

Вид: Печериця двоспорова *Agaricus bisporus* (J. Lge) Imbach
Заявка № 16448009 Назва сорту: Євроміцель E25 **Заявник (код):** 2224 **Власник сорту (код):** 2224
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.03.2017
Свідоцтво про державну реєстрацію № 170567
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Ніжка: за довжиною	коротка	3
2	Ніжка: діаметр	малий	3
3	Ніжка: співвідношення довжина / діаметр	середнє	5
4	Ніжка: форма поздовжнього розрізу	прямокутна	2
5	Ніжка: відстань від основи до залишка покривного кільця	середня	5
6	Шапінка: за висотою	середня	5
7	Шапінка: діаметр	середній	5
8	Шапінка: співвідношення висота / діаметр	середнє	5
9	Шапінка: форма поздовжнього розрізу	плеската	3
10	Шапінка: за товщиною у поздовжньому розрізі	середня	5
11	Шапінка: утворення лусочок	помірне	5
12	Шапінка: забарвлення	біле	1
13	Шапінка: зміна забарвлення маси після розтирання	помірна	5
14	Гіменіальні пластинки: забарвлення під час зняття покривала	світло-коричневе	2
15	Базидіоспори: середня кількість утворення спор	дві	2
16	Відкрита шапінка: діаметр	середній	5
17	Відкрита шапінка: за товщиною	тонка	3
18	Відкрита шапінка: розкриття країв	середнє	2
19	Відкрита шапінка: форма центральної частини верхньої сторони	плеската	2
20	Час першого дня збирання врожаю	пізній	7
21	Час піку першої хвилі плодоношення	середній	5

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Середня врожайність плодівих тіл – 33 кг/100 кг субстрату, тривалість циклу розвитку міцелію до плодоношення – 39 днів, тривалість періоду плодоношення – 15 днів, тривалість періоду зберігання при температурі +2...+4 – велика (понад 6 днів), діаметр шапинки – 7 см, довжина ніжки – 7 см, щільність консистенції плодівих тіл – середня, вміст сухої речовини – 6 %. Сорт придатний до переробки: соління, маринування, сушіння. Стійкість до хвороб: мокра гниль – 8 балів, суха гниль – 6 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.