

Вид: Печериця двоспорова *Agaricus bisporus* (J. Lge) Imbach
Заявка № 16448010 **Назва сорту:** Євроміцель Е67 **Заявник (код):** 2224 **Власник сорту (код):** 2224
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.03.2017
Свідоцтво про державну реєстрацію № 170568
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Ніжка: за довжиною	коротка	3
2	Ніжка: діаметр	середній	5
3	Ніжка: співвідношення довжина / діаметр	середнє	5
4	Ніжка: форма поздовжнього розрізу	прямокутна	2
5	Ніжка: відстань від основи до залишка покривного кільця	середня	5
6	Шапинка: за висотою	середня	5
7	Шапинка: діаметр	малий	3
8	Шапинка: співвідношення висота / діаметр	середнє	5
9	Шапинка: форма поздовжнього розрізу	обернояцеподібна	1
10	Шапинка: за товщиною у поздовжньому розрізі	тонка	3
11	Шапинка: утворення лусочок	помірне	5
12	Шапинка: забарвлення	біле	1
13	Шапинка: зміна забарвлення маси після розтирання	слабка	3
14	Гіментальні пластинки: забарвлення під час зняття покривала	світло-коричневе	2
15	Базидіоспори: середня кількість утворення спор	дві	2
16	Відкрита шапинка: діаметр	малий	3
17	Відкрита шапинка: за товщиною	тонка	3
18	Відкрита шапинка: розкриття країв	середнє	2
19	Відкрита шапинка: форма центральної частини верхньої сторони	заокруглена	1
20	Час першого дня збирання врожаю	ранній	3
21	Час піку першої хвилі плодоношення	ранній	3

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Середня врожайність плодівих тіл – 42 кг/100 кг субстрату, тривалість циклу розвитку міцелію до плодоношення – 35 днів, тривалість періоду плодоношення – 20 днів, тривалість періоду зберігання при температурі +2...+4 – мала (3 доби), діаметр шапинки 5 см, довжина ніжки – 5 см, щільність консистенції плодівих тіл – висока, вміст сухої речовини – 6,5 %. Сорт придатний до переробки: соління, маринування, сушіння. Стійкість до хвороб: мокра гниль – 6 балів, суха гниль – 5 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.