

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 15113014 Назва сорту: Банкерс **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.10.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160952

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	дуже слабка	1
9	Стебло: опушення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: пластинка за довжиною	довга	7
12	Листок: пластинка за шириною	широка	7
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
14	Листок: форма	широкоеліптична	3
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Листок: пухирчастість	дуже слабка	1
17	Листок: форма поперечного перерізу	опукла	7
18	Листок: глянуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	поникле	3
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє	1
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	сильна	7
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	слабка	3
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	сильна	7
35	Плід: глянуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	дуже мілка	1
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4
39	Плід: міждолні канавки за глибиною	помірні	5
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4
41	Плід: м'якоть за товщиною	дуже товста	9
42	Плодоніжка: за довжиною	довга	7
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	середній	5
48,1	Спійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9
48,2	Спійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	відсутня	1
48,3	Спійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1
49,1	Спійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9
49,2	Спійкість до Potato Virus: Патотип 1	наявна	9
49,3	Спійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	наявна	9
50	Спійкість проти Phytophthora capsici	відсутня	1
51	Спійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1
52	Спійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1
53	Спійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.