

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 15113010 Назва сорту: Палермо Заявник (код): 1730 Власник сорту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.11.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160950

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9
2	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0
3	Рослина: за довжиною стебла	довгра	7
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	довгі	7
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5
9	Стебло: опущення вузлів	слабке	3
10	Рослина: за висотою	дуже висока	9
11	Листок: пластина за довжиною	середня	5
12	Листок: пластина за шириною	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
14	Листок: форма	овальна	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма поперечного перерізу	опукла	7
18	Листок: глянсуватість	ознака не визначалась	0
19	Квітконіжка: положення	поникле	3
20	Квітка: антоціанове забарвлення пилляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досягненням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досягненням)	помірна	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	наявне	9
24	Плід: положення	поникле	3
25	Плід: за довжиною	дуже довгий	9
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже велике	9
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	рогоподібна	9
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	еліптична	1
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	помірна	5
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	слабка	3
32	Плід: структура поверхні	дуже зморшкувана	3
33	Плід: забарвлення (за досягнення)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягнення)	помірна	5
35	Плід: глянсуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	середня	5
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	відсутні або дуже мілкі	1
40	Плід: кількість долей	переважно дві	1
41	Плід: м'якоть за товщиною	тонка	3
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	тонка	3
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необрогтача	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ознака не визначалась	0
47	Час досягнення	пізній	7
48,1	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 0 (<i>Tobacco Mosaic Virus (0)</i>)	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 1-2 (<i>Tomato Mosaic Virus (1-2)</i>)	наявна	9
48,3	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 1-2-3 (<i>Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)</i>)	відсутня	1
49,1	Стійкість проти <i>Potato Virus Y (PVY)</i> : Штами збудника 0, 1, 1-2	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1 – 2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти <i>Rhynchosciara capsici</i>	ознака не визначалась	0
51	Стійкість проти <i>Cucumber Mosaic Virus (CMV)</i>	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.