

**Вид:** Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

**Заявка № 15113004 Назва сорту:** Сімпаті **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 09.11.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 160947**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9
2	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах І-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначалась	0
9	Стебло: опущення вузлів	ознака не визначалась	0
10	Рослина: за висотою	ознака не визначалась	0
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
14	Листок: форма	овальна	2
15	Листок: хвильистість краю	помірна	5
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма поперечного перерізу	ознака не визначалась	0
18	Листок: глянсуватість	ознака не визначалась	0
19	Квітконіжка: положення	напівлоніке	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначалась	0
21	Плід: забарвлення (перед досягненням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досягненням)	сильна	7
23	Плід: антоціанове забарвлення	ознака не визначалась	0
24	Плід: положення	поникле	3
25	Плід: за довжиною	короткий	3
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення настінка) базальної частини	округла	3
30	Плід: хвильистість перикарпію в базальній частині	ознака не визначалась	0
31	Плід: хвильистість перикарпію (за винятком базальної частини)	ознака не визначалась	0
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягнення)	оранжеве	2
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягнення)	помірна	5
35	Плід: глянсуватість	слабка	3
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4
39	Плід: міждоліні канавки за глибиною	ознака не визначалась	0
40	Плід: кількість долей	переважно чотири і більше	5
41	Плід: мякоть за товщиною	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортуюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3
47	Час досягнення	середній	5
48,1	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 0 ( <i>Tobacco Mosaic Virus (0)</i> )	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 1-2 ( <i>Tomato Mosaic Virus (1-2)</i> )	наявна	9
48,3	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 1-2-3 ( <i>Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)</i> )	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість проти <i>Potato Virus Y (PVY)</i> : Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1
49,2	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1 – 2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти <i>Phytophthora capsici</i>	ознака не визначалась	0
51	Стійкість проти <i>Cucumber Mosaic Virus (CMV)</i>	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна урожайність – 80 т/га; тривалість періоду до досягнення – 125 діб; товщина стінки плоду – 9 мм; середня маса плоду – 250 г; вміст вітаміну С – 145 мг%; вміст загального цукру – 4 %; вміст сухої речовини – 8 %.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** закритий ґрунт.