

**Вид:** Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

**Заявка № 15115037 Назва сорту:** Міланеза **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.10.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 160975**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №    | Ознака   | Проявлення             | Код |
|------|--|------------------------|-----|
| 1    | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія  | відсутнє               | 1   |
| 2    | Рослина: тип розвитку  | індетермінантний       | 2   |
| 3    | Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)            | ознака не визначається | 0   |
| 4    | Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині  | слабке                 | 3   |
| 5    | Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям                                   | довге                  | 7   |
| 6    | Листок: положення (у середній третині рослини)   | напівпоникле           | 7   |
| 7    | Листок: за довжиною  | середній               | 5   |
| 8    | Листок: за шириною   | широкий                | 7   |
| 9    | Листок: за розсіченістю  | двічі перистий         | 2   |
| 10   | Листок: розмір листочків (у середній частині листка)   | великий                | 7   |
| 11   | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення   | помірна                | 5   |
| 12   | Листок: глясуватість (як для б)  | слабка                 | 3   |
| 13   | Листок: пухирчастість (як для б)   | слабка                 | 3   |
| 14   | Листок: розмір пухирів (як для б)  | середній               | 5   |
| 15   | Листок: положення черешка листочків відносно головної осі  | горизонтальне          | 5   |
| 16   | Суцвіття: за типом   | переважно не галузисте | 1   |
| 17   | Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)  | відсутня               | 1   |
| 18   | Квітка: опушення приймочки маточки   | наявне                 | 9   |
| 19   | Квітка: забарвлення  | жовте                  | 1   |
| 20   | Квітковіжка: відокремлюючий шар  | відсутній              | 1   |
| 21   | Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітковіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки) | ознака не визначається | 0   |
| 22   | Плід: розмір   | середній               | 5   |
| 23   | Плід: відношення довжини до діаметра   | мале                   | 3   |
| 24   | Плід: форма поздовжнього розрізу   | сплюснута              | 2   |
| 25   | Плід: ребристість біля плодоніжки  | слабка                 | 3   |
| 26   | Плід: форма поперечного перерізу   | не кругляста           | 1   |
| 27   | Плід: заглиблення біля плодоніжки  | милке                  | 3   |
| 28   | Плід: розмір рубця плодоніжки  | середній               | 5   |
| 29   | Плід: розмір квіткового рубця  | малий                  | 3   |
| 30   | Плід: форма кінця плоду  | плеската               | 3   |
| 31   | Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі  | середній               | 5   |
| 32   | Плід: перикарпій за товщиною   | середній               | 5   |
| 33   | Плід: кількість насінневих камер   | три-чотири             | 3   |
| 34   | Плід: зелене плече (перед досяганням)  | відсутнє               | 1   |
| 35   | Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)  | ознака не визначається | 0   |
| 36   | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)  | ознака не визначається | 0   |
| 37   | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча)(перед досяганням)                                 | ознака не визначається | 0   |
| 38   | Плід: забарвлення (за досягання)   | червоне                | 5   |
| 39   | Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)   | червоне                | 5   |
| 40   | Плід: за твердістю   | твердий                | 7   |
| 41   | Плід: термін лежкості  | тривалий               | 7   |
| 42   | Час цвітіння   | середній               | 5   |
| 43   | Час досягання  | середній               | 5   |
| 44   | Плід: вміст сухої речовини (за досягання)  | середній               | 5   |
| 45   | Наявність сріблястості   | несприятливий          | 1   |
| 46   | Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>   | відсутня               | 1   |
| 47   | Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>  | наявна                 | 9   |
| 48,1 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>  | наявна                 | 9   |
| 48,2 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1                                   | ознака не визначалась  | 0   |
| 49   | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>                                    | відсутня               | 1   |
| 50,1 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )   | наявна                 | 9   |
| 50,2 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А   | ознака не визначалась  | 0   |
| 50,3 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В   | ознака не визначалась  | 0   |
| 50,4 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С   | ознака не визначалась  | 0   |
| 50,5 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D   | ознака не визначалась  | 0   |
| 50,6 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи Е   | ознака не визначалась  | 0   |
| 51,1 | Стійкість проти Tomato Mosaic Virus  | наявна                 | 9   |
| 51,2 | Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1   | ознака не визначалась  | 0   |
| 51,3 | Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2   | ознака не визначалась  | 0   |
| 51,4 | Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2   | ознака не визначалась  | 0   |
| 52   | Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>  | відсутня               | 1   |
| 53   | Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>  | відсутня               | 1   |
| 54   | Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.  | відсутня               | 1   |
| 55   | Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>  | відсутня               | 1   |
| 56   | Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>  | відсутня               | 1   |

| №  | Ознака  | Проявлення | Код |
|----|---|------------|-----|
| 57 | Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus   | відсутня   | 1   |
| 58 | Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus       | наявна     | 9   |
| 59 | Стійкість проти Leveillula taurica              | відсутня   | 1   |
| 60 | Стійкість проти Oidium lycopersicum             | наявна     | 9   |
| 61 | Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)     | відсутня   | 1   |
| 62 | Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою | середня    | 5   |
| 63 | Плід: зелені смуги (перед досяганням)           | відсутні   | 1   |
| 64 | Плід: глянсуватість шкірки                      | помірна    | 2   |
| 65 | Плід: епідерміс                                 | жовтий     | 2   |

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Маса товарного плоду – 130 г, вміст сухої речовини в плоді – 5,3 %, вміст загального цукру – 5,8 %, вміст вітаміну С – 27 мг%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** закритий ґрунт.