

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*  
**Заявка №** 12016041 **Назва сорту:** СБ Сігурді **Заявник (код):** 983 **Власник сорту (код):** 983  
**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №  
**Дата пріоритету:**  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 10.06.2016  
**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160895

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за ширину	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за ширину (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включено)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	21,4	31,5	21,2
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	2,9	2,6	-5,1
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	16	9	-20
Маса 1000 насінин, г	3,9	5,1	5
Висота рослин, см	117,2	138,9	121,3
Стійкість до вилягання, бал	8,3	8,8	9
Стійкість до посухи, бал	7,2	7,7	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,2	7	7,2
Перезимувало рослин, бал	7,9	7,9	8,3
Днів до досягнення	290	294	310
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,8	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8	9	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,8	9	9
Вміст білка, %	23,8	21,5	20,5
Вміст олії, %	46	48,4	49,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,6
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп.