

**Вид:** Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*

**Заявка № 14118007 Назва сорту:** Роксан **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 11.11.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 160987**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака   | Проявлення               | Код |
|----|--|--------------------------|-----|
| 1  | Плоїдність   | диплоїд                  | 2   |
| 2  | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля                          | наявне                   | 9   |
| 3  | Сім'ядолі: розмір  | середній                 | 5   |
| 4  | Листкова розетка: за шириною основи                                    | середня                  | 5   |
| 5  | Листок: положення у просторі   | напівпряме               | 3   |
| 6  | Листок: за довжиною  | довгий                   | 7   |
| 7  | Листкова пластинка: форма  | оберненояцеподібна       | 3   |
| 8  | Листкова пластинка: форма верхівки                                     | округла                  | 2   |
| 9  | Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення                      | відсутній                | 1   |
| 10 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення                 | помірна                  | 5   |
| 11 | Листкова пластинка: кількість лопатей                                  | середня                  | 5   |
| 12 | Листкова пластинка: надрізи краю                                       | наявні                   | 9   |
| 13 | Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною                           | неглибокі                | 3   |
| 14 | Листкова пластинка: опушення   | помірне                  | 5   |
| 15 | Черешок: антоціанове забарвлення                                       | наявне                   | 9   |
| 16 | Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення                       | помірна                  | 5   |
| 17 | Коренеплід: за товщиною  | середній                 | 5   |
| 18 | Коренеплід: головний корінь за шириною                                 | тонкий                   | 3   |
| 19 | Коренеплід: форма  | округла                  | 2   |
| 20 | Коренеплід: форма верхівки   | плеската                 | 2   |
| 21 | Коренеплід: форма основи   | округла                  | 4   |
| 22 | Коренеплід: забарвлення шкірки   | однокольорове            | 1   |
| 23 | Коренеплід: забарвлення верхньої частини                               | червоне                  | 3   |
| 24 | Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині | багряне                  | 2   |
| 25 | Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки       | ознака не визначається   | 0   |
| 26 | Коренеплід: кора за товщиною   | тонка                    | 3   |
| 27 | Коренеплід: забарвлення м'якоті  | матове біле              | 2   |
| 28 | Час досягання  | ранній                   | 3   |
| 29 | Коренеплід: здатність до утворення дулла                               | відсутня або дуже слабка | 1   |

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 26 т/га. Тривалість періоду до досягання – 35 діб. Середня маса плоду – 28 г. Вміст сухої речовини – 5,3 %. Вміст вітаміну С – 37 мг/г.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.