

Вид: Салат посівний листковий *Lactuca sativa L. var. secalina*

Заявка № 15120017 Назва сорту: Кірінія **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.11.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160994

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насініна: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	часточкова	2
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	відкрита головка	2
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекріття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	середньої щільності	5
11	Головка: розмір	малий	3
12	Лише для сортів маслянисто-головчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2
14	Листок: за товщиною	тонкий	3
15	Листок: положення за збиральної стигlostі (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	округла	4
17	Листок: форма верхівки	ознака не визначалась	0
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	слабка	3
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	слабка	3
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвильистість краю	сильна	7
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибину	глибока	7
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	синусоїдна (городчаста)	1
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне гілкування	ознака не визначалася	0
34	Час збиральної стигlostі	ознака не визначалась	0
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	пізній	7
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	середня	5
37	Рослина: фасциація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасциації (під час цвітіння)	сильна	7
39	Стійкість проти борошистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Izolate B1:16	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 17 т/га, тривалість періоду до досягнення – 65 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.