

Вид: Селера коренеплідна *Apium graveolens* L. var. *rapaceum* (Mill.) Gaud.

Заявка № 15201002 Назва сорту: Отаго **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.02.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 170228

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за висотою	низька	3
2	Листок: положення у просторі	напівпряме	3
3	Листки: кількість	середня	5
4	Листя: діаметр коренеплоду в місці прикріплення черешків	ознака не визначалась	0
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішніх листків	слабка	3
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
7	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	короткий	3
8	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
9	Листкова пластинка: відстань між 1-ю та 2-ю парами листочків	коротка	3
10	Черешок: за довжиною	короткий	3
11	Черешок: за ширину	вузький	3
12	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
13	Листкова пластинка: розмір верхівкового листочка	малий	3
14	Листочек: форма краю верхівки	гостра	1
15	Листочек: щільність надрізів краю	помірна	5
16	Листочек: розміщення часток	дотичне	2
17	Коренеплід: розмір	середній	5
18	Коренеплід: виступ на поверхні	слабкий	3
19	Коренеплід: основне забарвлення шкірки	блідувате	1
20	Лише для сортів, коренеплоди яких коричневого забарвлення. Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення шкірки	ознака не визначалась	0
21	Коренеплід: місце розміщення коренів	низьке	3
22	Коренеплід: кількість коренів	середня	5
23	Коренеплід: корені за товщиною	середні	5
24	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	округла	2
25	Коренеплід: забарвлення мякоті	біле	1
26	Коренеплід: внутрішнє заглиблення	має	3
27	Коренеплід: губчастоподібність мякоті	слабка	3
28	Коренеплід: внутрішня іржаста плямистість мякоті	слабка	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Збір сухої речовини в середньому за рік використання – 55 т/га. Тривалість періоду від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стигlosti – 140 діб, середня маса коренеплоду – 650 г, посухостійкість, бал (1–9) – 3, вміст клітковини – 1,3 %, лежкість, бал (1–9) – 7, стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe umbelliferarum* DB.) – 6, септоріоз (*Septoria apii* Chest.) – 5, суха гниль (*Phoma apiiicola* Kleb.) – 5, біла гниль (*Sclerotinia libertiana* Fuck.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся. Лісостеп, Степ.