

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 12031014 Назва сорту: Аурея Заявник (код): 1858 Власник сорту (код): 1858

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.08.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160845

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №  | Ознака   | Проявлення                | Код |
|----|--|---------------------------|-----|
| 1  | Світловий паросток: за розміром  | середній                  | 5   |
| 2  | Світловий паросток: за формою  | яйцеподібний              | 2   |
| 3  | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи                                       | сильна                    | 7   |
| 4  | Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи                         | середнє                   | 2   |
| 5  | Світловий паросток: опущення основи  | помірне                   | 5   |
| 6  | Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою  | середня                   | 5   |
| 7  | Світловий паросток: характеристика верхівки  | проміжна                  | 3   |
| 8  | Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки   | помірне                   | 5   |
| 9  | Світловий паросток: опущення верхівки  | сильне                    | 7   |
| 10 | Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків   | середня кількість         | 5   |
| 11 | Світловий паросток: довжина бічних пагінців  | середні                   | 5   |
| 12 | Рослина: тип розвитку  | проміжний                 | 2   |
| 13 | Рослина: габітус   | напіврозлогий             | 5   |
| 14 | Стебло: антоціанове забарвлення  | помірне                   | 5   |
| 15 | Листок: загальний розмір   | середній                  | 5   |
| 16 | Листок: відкритість  | відкритий                 | 5   |
| 17 | Листок: виявлення вторинних листочків  | помірне                   | 5   |
| 18 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення   | помірне                   | 5   |
| 19 | Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці                                      | слабке                    | 3   |
| 20 | Друга пара бічних листочків: за розміром   | малі                      | 3   |
| 21 | Друга пара бічних листочків: за ширину   | вузькі                    | 3   |
| 22 | Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення  | рідко                     | 3   |
| 23 | Листочек: хвилястість краю   | помірна                   | 5   |
| 24 | Листочек: глибина жилок  | глибоке                   | 7   |
| 25 | Листочек: глянсуватість верхнього боку   | не глянсуватий            | 3   |
| 26 | Листочек: опущеність пластинки на верхівці розетки   | наявна                    | 9   |
| 27 | Бутон: антоціанове забарвлення   | слабке                    | 3   |
| 28 | Рослина: за висотою  | висока                    | 7   |
| 29 | Рослина: рясність цвітіння   | відсутнє або дуже обрідне | 1   |
| 30 | Суцвіття: за розміром  | середнє                   | 5   |
| 31 | Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки  | слабке                    | 3   |
| 32 | Віночок квітки: розмір   | середній                  | 5   |
| 33 | Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку                                 | відсутнє або дуже слабке  | 1   |
| 34 | Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку                  | відсутнє або мале         | 1   |
| 35 | Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці  | відсутнє або дуже мале    | 1   |
| 36 | Рослина: час достигання  | ранній                    | 3   |
| 37 | Бульба: форма  | короткоovalна             | 2   |
| 38 | Бульба: глибина вічок  | мілкі                     | 3   |
| 39 | Бульба: колір шкірки   | жовтий                    | 2   |
| 40 | Бульба: забарвлення основи вічка   | жовте                     | 2   |
| 41 | Бульба: забарвлення м'якоті  | світло-жовте              | 3   |
| 42 | Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла | слабке                    | 3   |

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник   | Значення |          |       |
|--|----------|----------|-------|
|  | С        | Л        | П     |
| Урожайність, ц/га  |          | 182      | 174,2 |
| +,- до усередненої урожайності за 5 попередніх років, ц/га | -45      | -75,6    |       |
| +,- до усередненої урожайності за 5 попередніх років, %    | -20      | -30      |       |
| Вміст крохмалю, %  | 15,9     | 14,4     |       |
| Збір крохмалю, ц/га  | 28,5     | 24,6     |       |
| Вміст сухої речовини, %                                    | 25,5     | 25,7     |       |
| Днів, від повних сходів до всихання бадилля                | 88       | 60       |       |
| Маса бульб, г  | 88       | 79       |       |
| Смакові якості, бал  | 6        | 7        |       |
| Товарність бульб, %  | 78       | 86       |       |
| Лежкість, бал  | 9        | 7        |       |
| Стійкість до пошкодження нематодою                         | ст.      | ст.      |       |
| Стійкість до звичайного патотипу збудника раку             | ст.      | ст.      |       |
| Якість   | с. к.    | с. к.    |       |
| Напрям використання  | столовий | столовий |       |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.