

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 13196003

Назва сорту: ТІМБЕЛ

Заявник (код): 924

Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.08.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160875

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|-------------------------|-----|
| 1 | Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення) | прямий | 1 |
| 2 | Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні до рівнодення) | низька | 3 |
| 3 | Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення) | низька | 3 |
| 4 | Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби) | коротка | 3 |
| 5 | Час початку цвітіння | середній | 5 |
| 6 | Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками | часто | 7 |
| 7 | Квітка: частота рослин із змішаними квітками | рідко | 3 |
| 8 | Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками | відсутні або дуже рідко | 1 |
| 9 | Стебло: довжина найдовшого стебла за повного цвітіння (повністю сформоване суцвіття включно) | довге | 7 |
| 10 | Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 1-го скошування) | низька | 3 |
| 11 | Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 2-го скошування) | низька | 3 |
| 12 | Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 3-го скошування) | низька | 3 |
| 13 | Рослина: за природною висотою (після 4-го скошування) | низька | 3 |
| 14 | Рослина: за природною висотою (через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні до рівнодення) | низька | 3 |
| 15 | Рослина: за природною висотою (через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні після рівнодення) | низька | 3 |
| 16 | Рослина: тенденція до зростання під час зими | стан спокою клас 5 | 5 |
| 17 | Стійкість до <i>Verticillium alboatrum</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 18 | Стійкість до <i>Ditylenchus dipsaci</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 19 | Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 20 | Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 21 | Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 22 | Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 23 | Стійкість до <i>Verticillium alboatrum</i> | ознака не визначалась | 0 |
| 24 | Стійкість до <i>Ditylenchus dipsaci</i> | ознака не визначалась | 0 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | С | Л | П |
| Урожайність сухої речовини, ц/га | 39,6 | 91,4 | 93,2 |
| + , – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га | - 56 | - 4,3 | - 2,9 |
| + , – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, % | - 59 | - 4 | - 3 |
| Вегетаційний період, діб | 54 | 74 | 71 |
| Стійкість до, бал | | | |
| Виліягання | 8,8 | 9,0 | 9,0 |
| Посухи | 8,5 | 8,3 | 9,0 |
| Стеблової іржі | 9,0 | 8,7 | 7,5 |
| Борошнистої роси | 9,0 | 8,3 | 8,8 |
| Перезимувало рослин, бал | 7,0 | 9,0 | 7,0 |
| Залистяність, % | 46,7 | 37,3 | 50,5 |
| Вміст сирого протеїну, % | 19,8 | 20,2 | 20,0 |
| Напрямок використання | сінокіс, корм. | сінокіс, корм. | сінокіс, корм. |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.