

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.
Заявка № 12013014 Назва сорту: Камаро **Заявник (код):** 215 **Власник сорту (код):** 215
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.06.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160820
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Супліддя	одноросткове	1
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Листок: положення черешка	напівпряме	3
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	короткий	3
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	5
9	Листкова пластинка: забарвлення	переважно зелене	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	сильна	7
13	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	вузький	3
15	Листковий черешок: основне забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунті	середнє	5
17	Коренеплід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3
20	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	3
21	Коренеплід: форма кінчика	округла	2
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	помірне	5
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	червонувато-пурпурове	3
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	сильна	7
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність – 28 т/га, маса товарного коренеплоду – 200 г, тривалість періоду від повних сходів до початку достигання – 70 діб, вміст сухої речовини в плоді – 20%, вміст загального цукру – 12%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.