

Вид: Капуста червоноголова *Brassica oleracea* L. var. *rubra* DC.**Заявка №** 14097003 **Назва сорту:** Калібос **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.07.2016**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160844**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	висока	7
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	ознака не визначається	0
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	великий	7
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	довгий	7
4	Рослина: положення зовнішніх листків	сланкі	5
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	великий	7
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	широкояйцевидна	2
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	сильна	3
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	середні	5
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	фіолетовий	5
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	темне	7
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	надяна	9
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвильості краю	помірна	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1
17	Головка: форма поздовжнього розтину	кустasto-яйцевидна	7
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	довга	7
20	Головка: за діаметром	середня	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до основи	3
22	Головка: ступінь покриття	покрита	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	відсутній	1
25	Головка: забарвлення покривного листка	фіолетове	5
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	свіtle	3
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	ознака не визначається	0
28	Головка: внутрішнє забарвлення	фіолетове	4
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	помірне	5
30	Головка: за щільністю	середня	5
31	Головка: внутрішня структура	груба	7
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	коротка	3
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиравальної стигlosti	ознака не визначається	0
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиравальної стигlosti	пізний	7
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиравальної стигlosti	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягнання	пізний	7
35	Чоловіча стерильність	відсутня	1
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f sp. <i>Conglutinans</i>	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 65 т/га, період від повних сходів до початку досягнання – 105 діб, вміст сухої речовини – 9,1%, вміст загального цукру – 7%, вміст вітаміну С – 60 мг%, лежкість – 4 бали.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт.