

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.**Заявка №** 09035002 **Назва сорту:** Ніжинський місцевий **Заявник (код):** 1708 **Власник сорту (код):** 1708**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 13.06.2016**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160878**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	наявна	9
2	Рослина: тип росту	індeterminантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжузлів	довгі	7
4	Листкова пластина: положення у просторі	обвисле	3
5	Листкова пластина: за довжиною	довга	7
6	Листкова пластина: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластиинки	помірне	5
7	Листкова пластина: форма верхівки верхньої лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластина: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
9	Листкова пластина: пухирчастість	слабка	3
10	Листок: хвилястість країв	помірна	2
11	Листкова пластина: зубчастість країв	помірна	5
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	андромоцеїність	2
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1
15	Завязь: забарвлення зовнішнього покриву	бліле	1
16	Партенокарпія	відсутня	1
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	має	3
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	кутаста	3
22	Плід: форма основи плоду	тупа	3
23	Лиші для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	тупа	2
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стигlosti	зелене	3
26	За винятком білих сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	світле	3
27	Плід: ребристість	помірна	2
28	Плід: шви	наявні	9
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9
30	Плід: ступінь зморшкуватості	slabкий	3
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	дуже нещільний	1
33	Лиші сорти з блідою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву.	бліле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	малі	3
36	Плід: довжина смужок	середні	5
37	Плід: плямистість	наявна	9
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	по всій довжині	5
40	Плід: щільність плям	щільно	7
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стигlosti	коричневий	5
44	Стійкість до <i>Cladosporium cucumerinum</i>	ознака не визначалась	0
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	ознака не визначалась	0
46	Стійкість до борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0
48	Стійкість до бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до віруса пожовтіння судин огірка (CVYV)	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до віруса жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 25 т/га. Тривалість періоду від повних сходів до першого збирання – 48 діб. Тривалість періоду плодоношення – 32 доби.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.