

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*

Заявка № 14118001 Назва сорту: Марушка **Заявник (код):** 1781

Власник сорту (код): 1781

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.04.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160889

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Сім'ядолі: розмір	великий	7
4	Листкова розетка: за шириною основи	широка	7
5	Листок: положення у просторі	напівпряме	3
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листкова пластинка: за формою	оберненояцеподібна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	багато	7
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	помірні	5
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
17	Коренеплід: за товщиною	середній	5
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	товстий	7
19	Коренеплід: форма	льодяна бурулька	9
20	Коренеплід: форма верхівки	увігнута	1
21	Коренеплід: форма основи	вузькозагострена	1
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	біле	1
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	ознака не визначається	0
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: кора за товщиною	середня	5
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	матове біле	2
28	Час досягання	середній	5
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 92 т/га, середня маса плоду – 400 г, тривалість періоду до досягання – 75 діб, вміст сухої речовини – 11,1%, вміст вітаміну С – 28 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.