

**Вид:** Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* var. *capitata* L.**Заявка №** 15421001   **Назва сорту:** Експрешіон   **Заявник (код):** 840   **Власник сорту (код):** 840**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.07.2016**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160896**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

<b>№</b>	<b>Ознака</b>	<b>Проявлення</b>	<b>Код</b>
1	Насініна: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	малі	3
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	дуже сильне	9
10	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
11	Головка: розмір	середній	5
12	Лише для сортів маслянисто-головчастого типу у теплицях. Головка: закриття	ознака не визначалася	0
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3
14	Листок: за товщиною	середній	5
15	Листок: положення за збиравальної стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	поперечно-вузькоеліптична	6
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	темне	7
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянсуватість з верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	помірна	5
26	Листок: пухирі за розміром	середні	5
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: глибина розсіченості краю верхівки	помірна	5
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	слабка	3
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне гілкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиравальної стиглості	середній	5
35	Час початку появи квітконоса	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	ознака не визначалася	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	ознака не визначалася	0
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість до борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> )	наявна	9

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 29 т/га, середня маса плоду – 380 г, щільність головки – 4 бали, тривалість періоду до досягнення – 50 діб, лежкість – 60%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** закритий ґрунт.