

Вид: Горіх грецький *Juglans regia* L.

Заявка № 15284001 Назва сорту: Пам'яті Затокового **Заявник (код):** 2068 **Власник сорту (код):** 2068

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.10.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160916

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середньої сили	5
2	Дерево: габітус	напівпрямий	2
3	Дерево: щільність розміщення гілок	середня	5
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок	уздовж пагона (плодоношення на бічних «плодушках»)	3
5	Річний пагін: забарвлення	світло-коричневе	2
6	Листок: форма бічних листочків	широко-еліптична	7
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	середня кількість	5
8	Плід (горіх): за розміром	великий	7
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов)	кругла	1
10	Горіх: форма у поздовжньому перерізі перпендикулярно до шва	округла	1
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	округла	2
12	Горіх: коефіцієнт округлості	високий	7
13	Горіх: форма основи (у перерізі перпендикулярно до шва)	округла	2
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	округла	2
15	Горіх: помітність апікального кінчика	слабка	3
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	у верхній 2/3	2
17	Горіх: помітність «сідельця» на шві	слабка	3
18	Горіх: ширина «сідельця» на шві	вузьке	3
19	Горіх: глибина боріздки вздовж «сідельця» на шві	неглибока	3
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	слабко борозенчаста	1
21	Горіх: товщина шкаралупи	тонка	3
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	помірна	5
23	Горіх: товщина первинної і вторинної роз'єднуючих перетинок	тонкі	3
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	дуже легко	1
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	помірне	5
26	Ядро: за розміром	велике	7
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	велике	7
28	Час достигання	пізній	7
29	Час листопаду	середній	5
30	Листок: здатність до обпадання	обпадає	2
31	Оплодень: здатність до обпадання	обпадає	1
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5
33	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5
34	Час цвітіння жіночих квіток	між пізнім і дуже пізнім	8
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	раніше (протандрічний)	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня урожайність сорту становить 5,0 т/га. Середній урожай з дерева – 50,0 кг. Маса плоду середня – 12,1 г. Зимостійкість та посухостійкість – 8 балів. Стійкість до ураження бурою та чорною плямистістю – 8 балів, до пошкодження горіховою попелицею та горіховою міллю – 8 балів. Вміст у плодах жиру – 63,2 %, білка – 17,0 %, вуглеводів – 8,1 %. Вихід ядра – 56,0 %. Твердість шкаралупи – 4 бала. Група достигання – пізня. Дегустаційна оцінка – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.