

Вид: Лілійник *Haemocallis* L.**Заявка №** 14326005 **Назва сорту:** Ранок Ельфа **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 12.04.2016 **Патент №** 160244**Дата пріоритету:** 21.05.2014**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 19.05.2016**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160872**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт)	напівспляча	2
3	Рослина: час початку вегетації	ранній	3
4	Рослина: за висотою	низька	3
5	Рослина: габітус	компактний	1
6	Листок: положення у просторі	поникле біля верхівки	2
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: забарвлення	помірно зелене	2
10	Квітконос: розташування відносно листків	виступаючий над листками	2
11	Квітконос: залишкіність	наявна	9
12	Суцвіття: за щільністю	щільне	9
13	Суцвіття: приквітки	наявні	2
14	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
15	Час цвітіння	ранній	2
16	Рослина: тип цвітіння	звичайний	1
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1
18	Рослина: тривалість цвітіння	середня	5
19	Квітка: кількість на рослині	середня	5
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	середня	5
21	Квітка: діаметр	малий	3
22	Квітка: за типом	порна	3
23	Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: форма	ознака не визначалась	0
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	рожеве	3
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини	однокольорова	1
26	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	оранжево-рожеве	15
27	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	оранжеве	14
28	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	оранжево-рожеве	15
29	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13
30	Квітка: візерунок	ореол	5
31	Квітка: основне забарвлення рисунка на частках оцвітини	коричнево-пурпурове	26
32	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
33	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: третинне забарвлення	ознака не визначається	0
34	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: первинне забарвлення	ознака не визначається	0
35	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
36	Квітка: аромат	слабкий	2
37	Оцвітина: відносне розташування часток	дотичне	3
38	Оцвітина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки	підняті догори	1
39	Оцвітина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті	3
40	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	стисла	2
41	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	стисла	2
42	Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки	хвильястий	2
43	Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки	рівний	1
44	Квітка: характер поверхні внутрішньої пелюстки	рівна	1
45	Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки	рівна	1
46	Квітка: трубка оцвітини за довжиною	коротка	1
47	Квітка: за довжиною тичинки	середня	5
48	Тичинка: основне забарвлення	оранжево-рожеве	15
49	Тичинка: забарвлення піляків	рожево-коричневе	2
50	Пилок: забарвлення	помаранчеве	3
51	Пилок: життєздатність	середня	5
52	Плід: відсоток плодоцвітіння	середній	5
53	Стовпчик: основне забарвлення	оранжево-рожеве	15
54	Квітка: положення прямічки відносно піляків	вище	7
55	Прямічка: забарвлення	оранжево-рожеве	15
56	Рослина: тривалість періоду вегетації	середня	5

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослин – 50 см. Тривалість періоду від початку вегетації до початку цвітіння – 70 діб. Тривалість цвітіння суцвіття – 27 діб, тривалість цвітіння рослин – 35 діб. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації відсутнє. Декоративність – 92 бала. Коєфіцієнт вегетативного розмноження – 30%. Зимостійкість – 9 балів, посухостійкість – 8 балів. Стійкість проти ураження шкідниками та хворобами – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп.